

Beteg tájékoztató és beleegyező nyilatkozat

ízületi PRP (Drakula v. „Vámpírszérum”) kezeléshez

Tájékoztatjuk önt, hogy az ízületi PRP kezeléshez írásos beleegyezése szükséges. A beleegyezés aláírása előtt gondosan olvassa el a beteg tájékoztatót, és amennyiben kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

1. Beavatkozás lényege:

A ízületi PRP (Platelet Rich Plasma – angol = vérlemezkében gazdag plazma) kezelés másnéven „Vámpírszérum”, vagy „Drakula terápia” az ízületi porcok, szalagok és meniscusok (porckorongok) egy olyan regenerációt segítő kezelése, melynek során a szervezet saját regenerációs mechanizmusait aktiváljuk. A részben a véralvadásért felelős ún. vérlemezkék (thrombocyták) feladata a sérülések helyén a sebgyógyulási, a hajszálér újdonszövődési folyamatok beindítása, amit azok fehérje jellegű ún. növekedési faktorok (citokinek) termelésével valósítanak meg. A PRP terápia során mesterségesen sűrítjük be többszöröse a néhány ml-nyi levett vérben lévő vérlemezkéket. Ezzel egy aktív biológiai készítmény jön létre, melynek hatására új kötőszöveti sejtek képződnek, lecserélve az elöregedettek, a kötőszöveti rostok aránya eltolódik az ún. rugalmas rostok irányába és megnövekszik a sejtek közötti térbe kiválasztott hialuronsav mennyisége.

2. Az ízületi PRP terápia menete:

Orvosi konzultáció során

- Kikérdezzük a páciens panaszait, azok eredetét, korát, esetleges változásait.
- Átnézzük és értékeljük az eddigi születtett leleteket és az eddigi kezelési eredményeket.
- Szükség esetén további vizsgálatokat kérünk a diagnózis pontosításához (ezek más intézményben történnek)
- Tájékoztatjuk a beteget az ízületi PRP kezelés szövődésményveszélyeiről és a várható eredményről.
- Válaszolunk a felmerült kérdésekre.

A kezelés végrehajtása

- Általában a könyök vénából – egyéb vérvételhez hasonlóan – néhány kémcsőnyi vért veszünk le.
- Az aktív biológiai hatóanyag szétválasztása kb. 15 percet vesz igénybe.
- A szakmai szabályok betartása mellett ízületi injekció keretében adjuk be a vérlemezkékben gazdag plazma frakciót az érintett ízületbe.
- A PRP terápia befejezéseként passzív gépi ízületmozgató kezelés segítségével egyenletesen szétoszlatjuk a beadott hatóanyagot az ízület belfelületén.

3. Az ízületi PRP terápia előnyei:

A szervezet saját, tehát testazonos anyagával végzünk szöveti regenerációt és gyulladás csökkentést stimuláló biológiai kezelést. Így természetes anyaggal, természetes folyamatok serkentése révén érhető el a kívánt hatás. A fentiek miatt nem kell tartani nem kívánt gyógyszer mellékhatástól vagy allergiás reakciótól. Mivel a hatóanyag előállítására frissen vesszük le a vért, biztosak lehetünk abban, hogy a megfelelő mennyiségű, életképes, aktív vérlemezke áll rendelkezésünkre.

4. Az ízületi PRP terápia kockázatai, szövődményei:

Mivel a PRP kezelés saját vérből előállított, biológiailag aktív hatóanyaggal történik, a kezelés kockázata minimális. Ugyanakkor, mint minden, a bőrön át történő szúrással járó esetben, a legmondosabb sterilitási szabályok betartása és a páciens részéről az otthoni teendők és higiénés előírások alkalmazása ellenére gyulladós szövődmény előfordulhat. Ez ízületi szúrások esetén még fokozottabban érvényes!

Természetesen, bármilyen nem várt mellékhatás, ún.: duzzanat, bőrpír, lüktető fájdalom, láz jelentkezne soron kívül kérjen kontroll időpontot!

A kezelést követően egy-két napig feszülő érzés, nem lüktető jellegű fájdalom természetes lehet. E panaszok spontán múló jellegűek, de szükség esetén szabadon kapható fájdalomcsillapító bevehető, ill. borogatás alkalmazható.

5. Az ízületi PRP kezelés tervezett teljes időtartama: 35-40 perc

6. Beavatkozás tervezett időpontja: beleegyező nyilatkozat aláírását követő néhány percen belül, ill. Önnel egyeztetett későbbi, választott időpontban.

7. Az ízületi PRP terápia javasolt mennyisége, gyakorisága:

A kezelések javasolt száma általában 3-5 alkalom, havonta ismételve. Amennyiben az első 1-2 kezelés semmilyen pozitív változást nem eredményez, további szúrásoknak nincs értelme, amennyiben azonban kezelésről kezelésre csökkennek a panaszok, felső korlátja nincs. Mivel a kopásos, vagy autoimmun eredetű ízületi bántalmak teljesen nem szüntethetők meg helyi kezeléssel, bizonyos idő elteltével 1-1 ismétlődő kezelésre szükség van, így 3-6 havonta javasolt ismét elvégezni.

8. Beavatkozást követően javasolt életmód:

Testsúlyterhelés nélküli gyakori mozgás szükséges, melyet a kezeléskor személyes tanácsadás keretében megbeszélünk.

9. Beavatkozást végző személy neve:

Szakorvos:

Dr. Gajdos Gábor mozgásszervi sebész

Gyógytornász:

Körmendyné Zsóka

A betegtájékoztatót elolvastam, megértettem a beavatkozással kapcsolatban az írásbeli tájékoztatóban nem szereplő kérdéseimre szóbeli tájékoztatást kaptam, és további kérdéseim nincsenek.

Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre nem látható, az előzőekben nem említett szövődmények.

Az ízületi saját vér PRP kezelésbe saját felelősségemre beleegyezem:

Budapest, 201

.....
beavatkozásban résztvevő aláírása*

*Cselekvőképtelen vagy korlátozott cselekvőszemély esetén a törvényes képviselő aláírása